

Paciente: South Hills Red Velvet (Zoe)
DN: 20/07/2025 (14 meses)
Raça: Chow Chow
Proprietário: Márcio Medeiros
Registro: RG/SPX/25/02411
Microchip: 900233003932920

Espécie: Canina
Sexo: Fêmea
Data: 10/10/2026

Médico veterinário solicitante: Márcio Medeiros

Sinais clínicos / suspeita: Pesquisa de displasia de coxofemoral e cotovelo em caráter preliminar.

Comentários de exame: Paciente sob sedação

Projeção: Estudo radiográfico de pelve e cotovelo em projeções ortogonais, contemplando projeção flexionada de cotovelo

Achados radiográficos:

Pelve:

- Articulações coxofemorais congruentes, com interface articular fina e homogênea. Boa cobertura acetabular (ângulo de Norberg em cerca de **108°** na direita e **106°** na esquerda). Sem indícios de alterações degenerativas e apresentando superfícies regulares;
- Cabeças e colos femorais apresentando conformação anatômica, com cabeças femorais bem centralizadas nos acetábulos;
- Junções sacroilíacas preservadas;
- Ílio, ísquio e púbis apresentando conformação anatômica, radiopacidade e trabeculado ósseo preservados;
- Sacro apresentando conformação anatômica;
- Demais estruturas osteoarticulares e de tecidos moles, passíveis de avaliação, encontram-se sem alteração.

Cotovelos:

- Articulação do cotovelo congruente, sem desníveis e sem sinais de esclerose;
- Ausência de osteófitos em articulação do cotovelo;
- Não são identificadas lesões primárias;
- Rádio apresentando contornos, eixo ósseo, radiopacidade e trabeculado preservados;
- Ulna apresentando contornos, eixo ósseo, radiopacidade e trabeculado preservados;
- Demais estruturas osteoarticulares dentro dos padrões de normalidade.

Diagnóstico:

Em caráter de triagem / estudo preliminar:

Observam-se cotovelos congruentes, sem indícios de lesão primária e sem evidências de artrose. Apresentando graduação CBRV = **ED0 (cotovelos normais)**.

Articulações coxofemorais dentro dos padrões anatômicos da raça, sem indícios de doença articular degenerativa ou displasia coxofemoral. Apresentando graduação CBRV **A: Articulações coxofemorais normais (H.D. -)**. As demais estruturas passíveis de avaliação radiográfica encontram-se sem alteração.

O laudo oficial deve ser emitido pelo CBRV.

Nota 1: O ângulo de Norberg deve ser entendido como uma medida complementar de referência, e não uma forma de diagnóstico definitivo. Idealmente deve apresentar aproximadamente 105° ou mais.



Marcelo Taufer Boff
Radiologia Móvel
Médico Veterinário - CRMV 19555

Os achados radiográficos deste estudo devem ser interpretados à luz dos dados clínicos e epidemiológicos pelo médico veterinário responsável, a fim de garantir uma avaliação precisa e segura.





